

INFORMATIONEN ZUM RICHTIGEN AUSFÜLLEN DES FORMULARS

- AN: Attachment Niveau = ST+ GN
- SONDIERUNGSTIEFE (ST): notieren Sie Messungen ≥ 4 mm an jeweils 6 Seiten des Zahnes.
- GN (GINGIVANIVEAU): Abstand des Margo gingivae von der Schmelzzementgrenze in mm, gemessen auf der gleichen Stelle wie die ST. Im Falle einer Rezession mit positiven Werten; Bei einer Hyperplasie mit negativen Werten;
- FURKATIONEN:
 - Grad I: horizontaler Attachmentverlust im Furkationsgebiet ≤ 3 mm
 - Grad II: horizontaler Attachmentverlust > 3 mm aber nicht durchgängig
 - Grad III: durchgängige Furkation
- MOBILITÄT:
 - 0: physiologisch
 - 1: 0,2-1 mm horizontal
 - 2: 1-2 mm horizontal
 - 3: > 2 mm horizontal oder vertikal
- BLUTUNG: markieren Sie Blutung auf Sondieren mit •
- PLAQUE: notieren Sie Zahnbelag am Gingivarand mit +
- pack-years: gibt Auskunft über die Menge von insgesamt über die Zeit konsumierten Zigaretten, wobei 20 Zigaretten/Tag x 1 Jahr = 1 pack-year
20 Zig/Tag x 10Jahre = 10 pack-years
40 Zig/Tag x 1Jahr = 2 pack-years
10 Zig/Tag x 1Jahr = 0,5 pack-year usw.

ZAHNBEZOGENE DIAGNOSE:

GINGIVITIS: (G)

-ST ≤ 3 mm
oder bis 4mm ohne Attachmentverlust
u. Blutung nach Sondieren

PARODONTITIS: (P)

-ST ≥ 4 mm
-Blutung nach Sondieren
-Attachmentverlust,
-Knochenverlust

PARODONTITIS MIT KOMPLIKATIONEN (P+K):

-ST ≥ 4 mm
-Blutung nach Sondieren
-Attachmentverlust
-einer oder mehrere der folgenden Befunde:
-Knochenverlust $>$ als die Hälfte der Wurzellänge
-vertikale Knochendefekte
-Mobilitätsgrad II o. III
-Furkationsbefall Grad II o. III

ZAHNBEZOGENE PROGNOSE:

+ : gut voraussagbares Behandlungsergebnis
 \pm : fraglich
- : unbehandelbar